

Soulagez la douleur des vaccins avec emla^{MD}

Que votre patient reçoive un vaccin*, subisse un test sanguin, nécessite une i.v. à l'hôpital ou soit soumis à une intervention dermatologique mineure, emla^{MD} est là pour soulager la douleur et le stress.

Information sur le produit

Code de produit unique



Crème emla^{MD}
tube de 30 g

678045000394



Crème emla^{MD}
tube de 5 g
avec 2 pansements
Tegaderm^{MC}

678045000387



Crème emla^{MD}
5 x 5 g tube
avec 10 pansements
Tegaderm^{MC}

678045000370



Timbre emla^{MD}
2 x timbres à 1 g

678045000363



Timbre emla^{MD}
20 x timbres à 1 g

678045000547

* L'emploi emla^{MD} est approuvé pour les vaccins suivants : ROR (rougeole - oreillons - rubéole); DTC Polio (diphtérie - tétanos - coqueluche - poliomyélite); anti-Haemophilus influenzae de type b et anti-hépatite B.

EMLA^{MD} ne devrait être utilisé que dans les indications approuvées car les doses sûres maximales sont inconnues lorsqu'EMLA^{MD} est utilisé à d'autres fins. Des manifestations indésirables graves et mettant la vie en danger sont survenues lorsque la crème EMLA^{MD} a été appliquée sur une grande surface de peau en vue d'une analgésie topique durant des interventions esthétiques (p. ex. épilation au laser).

La crème EMLA^{MD} (lidocaïne à 2,5 % et prilocaïne à 2,5 %) est indiquée pour :

L'analgésie topique de la peau intacte en vue :

- de l'insertion d'une aiguille, p. ex. cathéters intraveineux ou avant une prise de sang;
- de l'immunisation uniquement avec les vaccins suivants, pour lesquels on n'a démontré aucune interaction avec EMLA^{MD} dans les essais cliniques (voir Partie II : ESSAIS CLINIQUES; Analgésie topique chez l'enfant; Vaccination) : ROR, DTC Polio; anti-Haemophilus influenzae de type b et anti-hépatite B. Comme l'effet d'EMLA^{MD} sur la réponse immunitaire à tout autre vaccin est inconnu, on ne peut recommander l'emploi de ce produit avec d'autres vaccins;
- d'une intervention chirurgicale superficielle, p. ex. excision de molluscum contagiosum, greffe de peau mince, électrolyse;
- d'un traitement au laser pour les interventions cutanées superficielles, tel le traitement contre la télangiectasie, les taches de vin, les verrues, les grains de beauté, les nodules cutanés et le tissu cicatriciel.

L'analgésie topique de la muqueuse génitale en vue :

- d'une anesthésie par infiltration locale;
- d'une intervention chirurgicale de moins de 10 minutes sur de petites lésions localisées superficielles, p. ex. ablation de condylomes par laser ou cautérisation, et biopsies.

L'analgésie topique des ulcères de jambe en vue :

- d'un parage chirurgical ou d'un débridement à l'aide d'instruments, p. ex. l'ablation des tissus nécrosés et des débris à l'aide de curettes, de ciseaux, de pinces fines, etc.

Le timbre EMLA^{MD} (lidocaïne à 2,5 % et prilocaïne à 2,5 %) est indiqué pour :

L'analgésie topique de la peau intacte en vue :

- de l'insertion d'une aiguille, p. ex. cathéters intraveineux ou avant une prise de sang;
- de l'immunisation uniquement avec les vaccins suivants, pour lesquels on n'a démontré aucune interaction avec EMLA^{MD} dans les essais cliniques : (voir Partie II : ESSAIS CLINIQUES; Analgésie topique chez l'enfant; Vaccination) ROR, DTC Polio; anti-Haemophilus influenzae de type b et anti-hépatite B. Comme l'effet d'EMLA^{MD} sur la réponse immunitaire à tout autre vaccin est inconnu, on ne peut recommander l'emploi de ce produit avec d'autres vaccins.

Consultez la monographie de produit à <https://aspenspharma.ca/download/1524/> pour d'importants renseignements concernant les contre-indications, les mises en garde et précautions les plus importantes, les mises en garde et précautions pertinentes, les conditions pour utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les instructions en matière de posologie.

La monographie de produit est également disponible en appelant le Service d'information médicale d'Aspen au : 1 (844) 330-1213.

Références :

1. Monographie de produit, Crème EMLA^{MD} et timbre EMLA^{MD}. Date de révision : le 9 août 2019.

Les marques de commerce sont la propriété de, ou exploitées sous licence par, le Groupe de sociétés Aspen. Droits d'auteur 2020 du Groupe de sociétés Aspen ou ses donneurs de licence. Tous droits réservés.