STANHEXIDINE® 4%

GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE
4% P/V
avec 4% v/v d'alcool isopropylique

CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE
Nettoyant antibactérien pour la peau

MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE
La chlorhexidine est un antiseptique bactéricide efficace contre une large gamme de bactéries végétatives gram positives et gram négatives, mais possède une activité plus marquée contre les bactéries gram positives. Quelques espèces de *Proteus* et de *Pseudomonas* y sont relativement moins sensibles. La chlorhexidine est inefficace contre les germes acido-résistants, les spores bactériennes, les champignons et les virus.

En tant que substance cationique, la chlorhexidine est incompatible avec les savons et les autres substances anioniques.

À une concentration de 4% la chlorhexidine est incompatible avec les borates, bicarbonates, carbonates, chlorures, citrates, phosphates et sulfates avec lesquels elle a tendance à former des sels de faible solubilité susceptibles de précipiter.

La chlorhexidine est plus active à pH neutre ; son activité est compromise en présence de matières organiques (sang, sérum, etc.) et par les phospholipides.

INDICATIONS ET USAGES CLINIQUES
STANHEXIDINE 4% est un nettoyant antibactérien peu moussant pour la peau.

La solution est prête à l'emploi ; ne pas diluer.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas employer chez les patients qui ont des antécédents d'hypersensibilité à la chlorhexidine (extrêmement rares).

BUREAU CHEF: 11,177 RUE HAMON, MONTRÉAL (QUEBEC) H3M 3E4 ● TEL.: (514) 335-0310 FAX: (514) 339-1407
HEAD OFFICE:
LABORATOIRES: 10,850 RUE HAMON, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3M 3A2
LABORATORIES: 11,911 MACHRINA WAY, UNIT 6, RICHMOND, B.C. V7A 4V3 ● TEL.: (604) 271-6228 FAX: (604) 271-4742

MISES EN GARDE

Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux, le cerveau, les méninges ou l'oreille moyenne. Si les yeux ont été éclaboussés accidentellement, ils devront être rincés immédiatement et abondamment avec de l'eau. Un contact prolongé peut causer des dommages aux yeux. Ne pas utiliser dans les cavités internes. Ne pas injecter. En cas de contact accidentel soupçonné, bien rincer à l'eau stérile avant l'intervention chirurgicale.

Garder hors de portée des enfants.

Si le produit est avalé accidentellement, provoquer le vomissement immédiatement. Administrer du lait, du blanc d'œuf ou du savon doux. Consulter un médecin.

PRÉCAUTIONS

Les tissus qui ont été en contact avec la chlorhexidine sont susceptibles de développer des tâches brunes si on tente de les blanchir avec un hypochlorite. Il est préférable d'utiliser un agent de blanchissage tel que le perborate.

EFFETS INDÉSIRABLES

Une irritation cutanée peut être observée dans certains cas. Des réactions allergiques systémiques à la chlorhexidine ont été rapportées mais celles-ci sont extrêmement rares.

TRAITEMENT EN CAS DE SURDOSAGE

La chlorhexidine administrée par voie orale est peu absorbée. Si le produit est avalé accidentellement, provoquer le vomissement immédiatement. Administrer du lait, du blanc d'œuf ou du savon doux. Consulter un médecin.

Il est possible qu'une transfusion de sang soit nécessaire en cas d'hémolyse.

MODE D'EMPLOI

Bien humecter la peau avec de l'eau. Appliquer une petite quantité de STANHEXIDINE® 4% avec 4% d'IPA, faire mousser et laver. Rincer à l'eau. POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.

BUREAU CHEF: 11,177 RUE HAMON, MONTRÉAL (QUEBEC) H3M 3E4 ● TEL.: (514) 335-0310 FAX: (514) 339-1407
HEAD OFFICE:
LABORATOIRES: 10,850 RUE HAMON, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3M 3A2
LABORATORIES: 11,911 MACHRINA WAY, UNIT 6, RICHMOND, B.C. V7A 4V3 ● TEL.: (604) 271-6228 FAX: (604) 271-4742

INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

MATIÈRE PREMIÈRE

Nom propre :

Solution de gluconate de chlorhexidine

Nom chimique :

1,1'-héxaméthylène bis-[5-(4-chlorophényl) biguanide] digluconate

Formule chimique :

$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \bullet 2\ C_6H_{12}O_7$

Poids moléculaire :

897,8

Propriétés physiques :

Liquide pratiquement incolore, limpide ou au plus très légèrement opalescent, inodore.

Solubilité :

Complètement miscible à l'eau, partiellement soluble dans l'éthanol à 96% (pas plus de 5 parties d'éthanol) et dans l'acétone (pas plus de 5 parties d'acétone).

STABILITÉ ET ENTREPOSAGE

Conserver à une température se situant entre 4 et 25°C dans des récipients fermés hermétiquement et à l'abri de la lumière. La solution demeure stable jusqu'à 30 jours suivant l'ouverture initiale de la bouteille.

DISPONIBILITÉ

STANHEXIDINE 4% est une solution rouge-orangée disponible en bouteilles de plastique de 450 mL (code de produit : L0000008) et de 4 L (code de produit : L0000014).

STANHEXIDINE 4% contient de 4% (p/v) de gluconate de chlorhexidine, 4% (v/v) d'alcool isopropylique comme agent de conservation, du rouge n°40 FD&C, du distéarate de glycol polyéthylénique (150), de l'éthamoxide de nonyl phénol, de la glycérine, du monolaurate polyoxyéthylénique (80) de sorbitanne dans de l'eau purifiée.

Ne contient aucun parabène, sulfite ou tartrazine.

Laboratoires Oméga Limitée

Montréal, Canada H3M 3E4 V-01