

TEMPRA® Infant Drops
80 mg/1 mL

- Alcohol, sugar* and ASA free
- Cherry and dye-free banana flavours

* Sweetened with saccharin sodium

TEMPRA® Children's Syrup Regular Strength
80 mg/5 mL

- Alcohol and ASA free
- Cherry flavour

TEMPRA® Children's Syrup Double Strength
160 mg/5 mL

- Alcohol and ASA free
- Cherry and dye-free banana flavours

Dosage: Administer single dose orally, every 4-6 hours, according to the weights listed below with a daily maximum of 5 doses/24 hours.

Dosage ¹			TEMPRA® Infant Drops 80 mg/1 mL 0 - 23 months Use supplied dropper only	TEMPRA® Children's Syrup Regular Strength 80 mg/5 mL 2 - 5 years Use supplied dosage cup only	TEMPRA® Children's Syrup Double Strength 160 mg/5 mL 4 - 10 years Use supplied dosage cup only
Weight (kg)	Weight (lbs)	Age			
2.0 - 5.4	6 - 11	0 - 3 months	Consult a physician		
5.5 - 7.9	12 - 17	4 - 11 months	1.0 mL		
8.0 - 10.9	18 - 23	12 - 23 months	1.5 mL		
11.0 - 15.9	24 - 35	2 to < 4 years		10 mL	5 mL
16.0 - 21.9	36 - 47	4 to < 6 years		15 mL	7.5 mL
22.0 - 26.9	48 - 59	6 to < 9 years			10 mL
27.0 - 31.9	60 - 71	9-10 years (see weight)			12.5 mL
32.0 - 43.9	72 - 95	9-10 years (see weight)			15 mL

¹ These doses are based on weight, not age, and offer more specific doses than in the general instructions on label/carton.

WARNINGS

DO NOT USE with other drugs containing **acetaminophen**.

DO NOT take more than the recommended dose unless advised by a doctor.

Taking more than the maximum daily dose may cause **severe or possibly fatal liver damage**.

Do not take if allergic to acetaminophen.

Ask a doctor or a pharmacist before use if:

- you have a serious liver or kidney disease;
- you use any other medications including natural health products, prescription drugs, salicylates or other pain and fever relief medications (nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)).

Consult a doctor if:

- you develop allergic reactions such as wheezing, rash or itching;
- your symptoms last for more than five days, or fever lasts more than three days.

OVERDOSE: In the case of an overdose, even if there are no signs or symptoms, call your Poison Control Centre or physician immediately. Within the first 24 hours your infant or child may experience nausea or vomiting, increased sweating, diarrhea, loss of appetite and stomach pain. Medical attention is critical, even in the absence of symptoms.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Safety sealed bottle. Do not use if seal is broken.

Paladin Labs Inc., Montreal, Quebec, H4P 2T4 ☎ 1-888-550-6060



TEMPRA® Gouttes pour nourrissons
80 mg/1 mL

- Sans alcool ni sucre* ni AAS
- Arôme de cerises et arôme de banane sans colorant

* Édulcoré avec de la saccharine sodique

TEMPRA® Sirop pour enfants concentration courante
80 mg/5 mL

- Sans alcool ni AAS
- Arôme de cerises

TEMPRA® Sirop pour enfants concentration double
160 mg/5 mL

- Sans alcool ni AAS
- Arôme de cerises et arôme de banane sans colorant

Posologie : Administrer la dose, établie selon le poids dans le tableau ci-dessous, par voie orale aux 4 à 6 heures. Posologie maximale quotidienne : Ne pas excéder 5 doses/24 heures.

Posologie ¹			TEMPRA® Gouttes pour nourrissons 80 mg/1 mL De 0 à 23 mois N'utiliser que le compte-gouttes fourni	TEMPRA® Sirop pour enfants concentration courante 80 mg/5 mL De 2 à 5 ans N'utiliser que la mesure fournie	TEMPRA® Sirop pour enfants concentration double 160 mg/5 mL De 4 à 10 ans N'utiliser que la mesure fournie
Poids (kg)	Poids (lb)	Âge			
2,0-5,4	6-11	0-3 mois	Consulter un médecin		
5,5-7,9	12-17	4-11 mois	1,0 mL		
8,0-10,9	18-23	12-23 mois	1,5 mL		
11,0-15,9	24-35	2 à < 4 ans		10 mL	5 mL
16,0-21,9	36-47	4 à < 6 ans		15 mL	7,5 mL
22,0-26,9	48-59	6 à < 9 ans			10 mL
27,0-31,9	60-71	9-10 ans (voir le poids)			12,5 mL
32,0-43,9	72-95	9-10 ans (voir le poids)			15 mL

¹ Les doses sont établies en fonction du poids et non de l'âge de l'enfant et sont donc plus précises que celles indiquées dans le mode d'emploi de l'étiquette ou de l'emballage des produits.

MISES EN GARDE

NE PAS UTILISER avec d'autres médicaments contenant de l'**acétaminophène**.

NE PAS dépasser la dose maximale recommandée, à moins d'avis contraire du médecin. Une surdose peut causer une **atteinte au foie grave pouvant entraîner la mort**. Ne pas utiliser en présence d'allergie à l'acétaminophène.

Consulter un médecin ou un pharmacien avant de prendre ce médicament si :

- vous souffrez d'une affection grave du foie ou des reins
- vous prenez d'autres médicaments, y compris des produits de santé naturels, des médicaments sur ordonnance, des salicylates ou d'autres médicaments pour soulager la douleur et la fièvre (anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS))

Consulter un médecin :

- en présence de réactions allergiques comme des troubles respiratoires, une éruption cutanée ou des démangeaisons
- si les symptômes persistent au-delà de cinq jours ou si la fièvre dure plus de trois jours

SURDOSAGE : Dans les cas de surdose, communiquer immédiatement avec le centre antipoison le plus proche ou avec un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes. Au cours des 24 premières heures, les symptômes de surdose suivants peuvent se manifester chez votre enfant : nausées ou vomissements, transpiration anormale, diarrhée, perte d'appétit et douleurs abdominales. Il importe d'obtenir des soins médicaux même en l'absence de symptômes.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Flacon scellé. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

Laboratoires Paladin inc., Montréal (Québec) H4P 2T4 ☎ 1-888-550-6060

